



# 医療安全レター

医療法人社団回心会 ロイヤル病院 医療安全管理委員会 第 11 号 2010/12/20 発行

<お願い>★この医療安全レターは、申し送りノートにはさみ、皆で必ず回覧してください。


## </ノロウイルス（感染性胃腸炎）について>

**病原体：**/ノロウイルス (Norovirus) は全世界的に分布し、食品や手指、飛沫等を介して経口的に感染し、乳幼児から成人、高齢者まで幅広い年齢層におう吐や下痢などの胃腸炎症状を引き起します。

**潜伏期間：**潜伏期間（感染から発症までの時間）は平均1～2日ですが、食中毒では食後8時間前後で発症したとの報告もあります。

**症状：**主な症状は吐き気、おう吐、下痢、腹痛。初期症状は、急激に発症する吐き気、おう吐で、続いて下痢、腹痛や発熱の症状ができます。下痢では水様便が数回程度、発熱は高くても38℃台までが多く、症状の持続期間は約3日で、予後は良好です。しかし、乳幼児や高齢者などで、下痢等による脱水症状が認められる場合は、輸液などの対症的療法が必要になることがあります。なお、感染しても軽い風邪のような症状だけの場合や、自覚症状のない場合もあります。

### 感染経路



- ① 感染者のおう吐物やふん便処理時に飛沫を吸い込んだり、処理後の手洗いが不十分な場合
- ② 感染者のおう吐物やふん便が乾燥して空気中に漂ったウイルスを吸いこんだ場合
- ③ 感染者が用便後等に触れた箇所を介して他の人の手指が汚染されて、感染する場合
- ④ 乳幼児間でお互いの手指やおもちゃ等を介して、感染する場合

### 予防

#### 換気



#### 処理時の感染防護具の着用

マスク



手袋

エプロン

#### 消毒（ハイター等）



#### 手洗い



★ 当院でも、過去にアウトブレイクがありました。

★ 院内に持ち込まないよう、嘔吐・下痢症状のある方は、出勤せず電話連絡をしてください。

○マスクの使用上注意点：マスクは、「鼻と口をおおうモノ」です。



うでマスク

禁止



あごマスク

禁止

